

PROSPECTION MYCOLOGIQUE
EFFECTUEE LE 04.11.2022
A L'ECOMUSEE D'ALSACE

PAR

DANIEL DOLL, PATRICK GOETZMANN ET PHILIPPE DEFRAZOUX

1ERE PARTIE

10 NOUVEAUX TAXONS

POUR L'INVENTAIRE DE LA FONGE

Agaricus macrocarpus F.H. Møller, 1952 - Agaricales - Agaricaceae

Bisporella sulfurina (Quél.) S.E. Carp., 1974 - Helotiales - Helotiaceae

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner, 1935 - Agaricales - Bolbitiaceae
(Nouveauté alsacienne)

Crepidotus malachius (Berk. & Curt.) Sacc. - Agaricales - Crepidotaceae
(2^{ème} nouveauté alsacienne)

Hygrocybe tristis (Pers.) Moeller, 1945 - Tricholomatales - Hygrophoraceae

Hymenoscyphus monticola (Berk.) Baral, 2005
Synonyme : *Phaeohelotium monticola* (Berk.) Dennis, 1964
Helotiales - Helotiaceae

Lentinus strigosus Fr., 1825 forma - Polyporales - Panaceae

Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Quél., 1878 - Tricholomatales - Marasmiaceae

Mucidula mucida (Schrad.) Pat., 1887

Synonyme : *Oudemansiella mucida* (Schrad.) Höhn., 1910

Tricholomatales - Physalacriaceae

Peziza bovina W. Phillips, 1887 - Pezizales - Pezizaceae

(NOTA : LE DERNIER INVENTAIRE DE LA FONGE COMPRENAIT 960 TAXONS

LE TOTAL ACTUEL EST DE 970 TAXONS)

Déterminateur « Fonge » : Daniel DOLL

Photographies réalisées par Philippe DEFROUIN



Agaricus macrocarpus F.H. Møller, 1952
Agaric (psalliote) géant des bois - Agaricales - Agaricaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace

(zone B-2)



***Bisporella sulfurina* (Quél.) S.E. Carp., 1974 - Helotiales - Helotiaceae**

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace

sur *Diatrype sp.* - Xylariales - Diatrypaceae

« sur un vieux tas de bois »

(zone vers H-6)



Cerocorticium molare (Chaillet ex Fr.) Jülich & Stalpers, 1980
Synonyme : *Radulomyces molaris* (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ., 1960
Polyporales - Hyphodermataceae

(zone H2)




***Conocybe pubescens* (Gillet) Kühner, 1935 - Agaricales - Bolbitiaceae**
« sur bouse »
Nouveauté alsacienne
(zone B-2)



***Conocybe pubescens* (Gillet) Kühner, 1935 - Agaricales - Bolbitiaceae**

« sur bouse »


(zone B-2)



Vue n° 1 au microscope de :

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner, 1935 - Agaricales - Bolbitiaceae

Grandes spores (16-18x8-10μm) à port germinatif large et cystides lécythiformes.
(eau, 400x)



Vue n° 2 au microscope de :

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner, 1935 - Agaricales - Bolbitiaceae

Présence de caulocystides lécythiformes. (eau, 400x)



Cortinarius galeobdolon Melot, 1995 - Agaricales - Cortinariaceae

(zone vers B-2)



Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr., 1838
Cortinaire amarissime - Cortinaire scintillant - Agaricales - Cortinariaceae

(zone vers B-2)



***Crepidotus malachius* (Berk. & Curt.) Sacc. (non mentionné dans l'INPN)**
Crépidote mollet - Agaricales - Crepidotaceae

(sur un vieux tas de bois)

(zone vers H-6)

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace

(Deuxième découverte alsacienne)



Cupophyllum virgineus (Wulfen) Kovalenko, 1989
Hygrophore blanc de neige - Tricholomatales - Hygrophoraceae

(zone vers G-7)



Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni, 1888

Cyathe coprophile - Nidulariales - Nidulariaceae (zone vers B-2)



Daedaleopsis confragosa var. *tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer, 1953

Tramète tricolore - Lenzite tricolore - Polyporales - Polyporaceae

(zone H-6)



***Funalia trogii* (Berk.) Bondartsev & Singer, 1941**
Tramète du peuplier - Polyporales - Polyporaceae

sur :

Populus tremula L., 1753 - Peuplier tremble - Malpighiales - Salicaceae
(zone vers H-6)



***Hygrocybe conica* var. *chloroides* (Malençon) Bon, 1985**
Tricholomatales Hygrophoraceae (zone vers G-7)



***Hygrocybe tristis* (Pers.) Moeller, 1945**
Hygrophore triste - Tricholomatales - Hygrophoraceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace
(zone vers G-7)



***Hymenoscypus monticola* (Berk.) Baral, 2005**


Synonyme : *Phaeohelotium monticola* (Berk.) Dennis, 1964

Helotiales - Helotiaceae

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace

sur :

Daedaleopsis confragosa var. *tricolor* (Bull.) Bondartsev & Singer, 1953
Tramète rougissante var. tricolor - Polyporales - Polyporaceae (zone vers G-7)



Vue au microscope de :

Hymenoscypus monticola (Berk.) Baral, 2005

Synonyme : *Phaeohelotium monticola* (Berk.) Dennis, 1964

Helotiales - Helotiaceae

Base de l'asque avec crochet, paraphysé et spore multiguttulée. (eau, 400x)



Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat., 1887 (INPN)
Psathyrella lacrymabunda (Bull.) M.M. Moser ex A.H. Sm., 1972
Lacrymaire velouté - Agaricales - Psathyrellaceae

(zone vers b-3)



***Leccinum albostipitatum* Den Bakker & Noordeloos, 2005 (nom actuel)**

Synonyme : *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray, 1821

Bolet orangé - Boletales - Boletaceae

(zone E1)



***Lentinus strigosus* Fr., 1825 forma « rare » - Polyporales - Panaceae**

Nouveauté pour l'Inventaire de la Fonge de l'Ecomusée d'Alsace

« Nota : sur INPN en premier : *Panus lecomtei* (Fr.) Corner, 1981 » (zone H2)

« *Lentinus strigosus* va être séquencé en Espagne »